

Sabril® (vigabatrina) para solución oral
Venta con receta solamente

Instrucciones para mezclar y administrar SABRIL para solución oral a su bebé

Asegúrese de leer, entender y seguir estas instrucciones sobre la forma correcta de mezclar SABRIL para solución oral para administrar a su bebé. Hable con su médico si tiene alguna pregunta acerca de la dosis correcta de medicamento para administrar a su bebé o sobre cómo mezclarlo.

- SABRIL para solución oral se presenta en polvo.
- Cada paquete contiene 500 mg de SABRIL para solución oral.
- El polvo en los paquetes se debe mezclar con **agua solamente**. El agua puede estar fría o a temperatura ambiente.
- El médico de su bebé le dirá:
 - cuántos paquetes de SABRIL para solución oral necesitará su bebé para cada dosis.
 - cuántos mililitros (ml) de agua debe usar para mezclar una dosis de SABRIL para solución oral para su bebé.
 - cuántos mililitros (ml) de la mezcla necesitará darle a su bebé después de mezclar el polvo con agua. Esta es la cantidad de medicamento que debe darle a su bebé para una dosis de SABRIL para solución oral.
- Debe administrarle SABRIL para solución oral a su bebé inmediatamente después de mezclarlo.


Suministros necesarios para mezclar una dosis de SABRIL para solución oral:



- La cantidad de paquetes de SABRIL para solución oral necesarios para la dosis de su bebé.
- 2 vasos limpios: 1 para mezclar y 1 para el agua. El vaso que utilice para mezclar SABRIL para solución oral debe ser transparente, para que pueda ver si el polvo se disolvió.
- Agua para mezclar con SABRIL para solución oral.
- Jeringa pequeña para administración oral de 3 ml y jeringa grande para administración oral de 10 ml, provistas.

- Cucharita u otro utensilio limpio para revolver.
- Tijeras.

Detalle de la jeringa para administración oral.



1. Tome **1** de los vasos vacíos y la cantidad de paquetes que necesitará para una dosis.
2. Antes de que abra el paquete, golpéelo suavemente para que todo el polvo quede en el fondo del paquete.
3. Utilice un par de tijeras para cortar y abrir el paquete de SABRIL para solución oral por la línea punteada.
4. Vacíe el contenido completo del paquete de SABRIL para solución oral en **1** de los vasos vacíos limpios. (Figura A)



Figura A

5. Repita los pasos 2 a 4 detallados anteriormente para abrir todos los paquetes necesarios para una dosis de SABRIL para solución oral.
6. Tome el **otro** vaso y llénelo hasta la mitad con agua (Figura B). No mezcle SABRIL para solución oral con nada que no sea agua.



Figura B

7. Usará la jeringa para administración oral más grande (10 ml) para extraer el agua necesaria para mezclar con el polvo de los paquetes. **Cada paquete de SABRIL para solución oral necesita ser mezclado con 10 ml de agua.**

Por ejemplo:

- Si está usando un paquete de SABRIL para solución oral, necesitará usar 10 ml de agua (llene una vez la jeringa para administración oral de 10 ml).
 - Si está usando dos paquetes de SABRIL para solución oral, necesitará usar 20 ml de agua (llene dos veces la jeringa para administración oral de 10 ml).
 - Si está usando tres paquetes de SABRIL para solución oral, necesitará usar 30 ml de agua (llene tres veces la jeringa para administración oral de 10 ml).
8. Tome la **jeringa para administración oral** más grande (la jeringa para administración oral de 10 ml). Use la jeringa para administración oral para extraer 10 ml de agua. Para hacer esto, coloque el **extremo** de la jeringa para administración oral completamente dentro del agua en su vaso. Luego tire del émbolo hacia arriba en dirección a usted hasta que el anillo negro del émbolo blanco se encuentre en la línea de 10 ml del cuerpo de la jeringa para administración oral (Figura C).



Figura C

9. Si ve burbujas de aire en la jeringa para administración oral después de extraer el agua, invierta la jeringa para administración oral de manera que el extremo quede apuntando hacia arriba (Figura D). El aire se desplazará hacia la parte superior de la jeringa para administración oral. Tire del émbolo hacia atrás en dirección a usted y luego empújelo suavemente dentro de la jeringa para eliminar las burbujas. Es normal que queden pequeñas burbujas.



Figura D

10. Asegúrese de que la jeringa para administración oral esté llena de agua hasta la línea de 10 ml (Figura E).



Figura E

11. Vacíe el agua de la jeringa para administración oral directamente en el vaso con SABRIL para solución oral. Esto se hace empujando hacia abajo el émbolo de la jeringa para administración oral **lentamente** mientras el extremo de la jeringa está dentro del vaso (Figura F).



Figura F

Repita los pasos 8 a 11 hasta que haya añadido toda el agua que necesita para mezclar una dosis de SABRIL para solución oral en el vaso que contiene el polvo.

12. Revuelva la mezcla con la cucharita o con otro utensilio limpio hasta que la solución esté transparente (Figura G). Esto significa que todo el polvo está disuelto.



Figura G

13. Use la jeringa para administración oral para extraer la cantidad de ml de la mezcla que le dijo su médico. Si está administrando **3 ml o menos** de la mezcla, use la jeringa para administración oral más pequeña (jeringa para administración oral de 3 ml). Si está administrando **más de 3 ml** de la mezcla, use la jeringa para administración oral de 10 ml. (Es la jeringa para administración oral que acaba de usar para añadir el agua).

14. Introduzca el **extremo** de la jeringa para administración oral completamente dentro de la mezcla. Tire del émbolo hacia arriba en dirección a usted para extraer la mezcla. Deténgase cuando el anillo negro del émbolo blanco quede alineado con las marcas del cuerpo de la jeringa para administración oral que correspondan a la cantidad de ml de la mezcla que su médico le dijo que le diera a su bebé (Figura H).



Figura H

15. Si ve burbujas o aire en la jeringa para administración oral después de extraer la mezcla, invierta la jeringa para administración oral de manera que el extremo quede apuntando hacia arriba (Figura I). El aire se desplazará hacia la parte superior de la jeringa para administración oral. Tire del émbolo hacia atrás en dirección a usted y luego empújelo suavemente dentro de la jeringa para eliminar las burbujas. Es normal que queden pequeñas burbujas.



Figura I

16. Introduzca el extremo de la jeringa para administración oral en la boca de su bebé y apunte la jeringa para administración oral hacia cualquiera de las mejillas del bebé (Figura J). Empuje el émbolo suavemente, **de a pequeñas cantidades cada la vez**, hasta administrar toda la mezcla de la jeringa para administración oral.



Figura J

17. Si la dosis que le está administrando a su bebé es mayor de 10 ml, repita los pasos 14 a 16 hasta que administre la dosis total de mezcla que le prescribió el médico.
18. Deseche toda la mezcla que sobre. No guarde ni vuelva a usar la mezcla que sobró.
19. Lave las jeringas para administración oral y los vasos para mezclar con agua tibia. Para limpiar las jeringas para administración oral, retire el émbolo tirando suavemente de él hacia afuera del cuerpo de la jeringa. El cuerpo de la jeringa y el émbolo se pueden lavar a mano con agua y jabón, enjuagar y dejar secar, o se puede colocar el cuerpo de la jeringa y el émbolo en el estante para utensilios del lavavajillas, lavar a máquina y secar.

Esta Guía del medicamento ha sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos (Food and Drug Administration) de EE. UU.

Comercializado por: Lundbeck Inc., Deerfield, IL 60015, EE. UU.



® Marca registrada de Lundbeck Inc.

Publicado: Agosto de 2009